


DISTRICT de CARMAN

Sommaire de la MR de Dufferin et le village de Carman

5 085 HABITANTS




2,8 %

croissance 2013-2018



SH-SS 60 802 \$
MB 59 093 \$



ABORDABILITÉ DU LOGEMENT

31 % des locataires & 7 % des propriétaires dépensent 30 % et + sur les frais de logement, semblable à la région



SCOLARITÉ

15 ans et + sans certificat, degré ni diplôme, mais la majorité (46,9 %) a fait des études postsecondaires




INDICE DES FACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES


Reflète les conditions socio-économiques et les déterminants sociaux de la santé (revenu, statut, situation de famille, scolarité, chômage)

MEILLEUR VS le MB & S'AMÉLIORE

CHÔMAGE




sans-emploi en % de la population active




ESPÉRANCE DE VIE

plus haute chez les femmes
vs le MB & s'améliore



GROSSESSES chez les ADOS


taux plus bas vs le MB




DIABÈTE

prévalence plus basse vs le MB
(incidence aussi plus basse)

MALADIES CARDIOVASCULAIRES




HYPERTENSION
% plus bas vs le MB &
en baisse au fil du temps



**INSUFFISANCE CARDIAQUE
CONGESTIVE** en baisse

MALADIES MUSCULO-SQUELETTIQUES




ARTHRITE
en baisse au fil du temps




OSTÉOPOROSE
en baisse au fil du temps

MALADIES RESPIRATOIRES




MORBIDITÉ RESPIRATOIRE TOTALE
% plus bas vs le MB & en baisse




L'ASTHME chez les ENFANTS
% plus bas vs le MB

SANTÉ MENTALE




TROUBLES ANXIEUX & DE L'HUMEUR % plus bas vs le MB



TROUBLES LIÉS À LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES
% plus bas vs le MB

SOINS PRIMAIRES



MAJORITÉ DES SOINS
% plus bas vs le MB



PRESCRIPTION EXCESSIVE DE BENZODIAZÉPINES aux PERSONNES AGÉES
(communauté) en baisse

DÉFINITIONS

Revenu médian des ménages : Revenu médian combiné total de tous les membres du ménage de plus de 15 ans après impôt

Faible revenu : Par faible revenu on entend 50 % du revenu médian au Canada ajusté pour la taille et la composition de la famille, en % de ménages et % d'enfants (17 ans et moins)

Abordabilité du logement : Le logement n'est pas abordable s'il faut dépenser 30 % ou plus du revenu du ménage sur les coûts de logement (p.ex. électricité, eau, services municipaux, loyer, hypothèque, etc.)

Scolarité : % des 15 ans et plus sans certificat, diplôme, ni degré

Indice des facteurs socio-économiques : Reflet du statut socio-économique et les déterminants sociaux de la santé en résultat combiné du revenu moyen des ménages, % de ménages de familles monoparentales, taux de chômage chez les 15 ans et plus et % des 15 ans et plus sans diplôme d'études secondaires

Chômage : % des 15 ans et plus sans emploi en % de la population active

Espérance de vie : Longévité prévue en années selon les causes de décès

Grossesses chez les adolescentes : Taux de grossesses (naissances vivantes, mortinaissances, avortements et grossesses ectopiques) par 1 000 habitantes de 15 à 19 ans

Prévalence du diabète : % total des habitants avec diagnostic de diabète (types 1 et 2, l'incidence correspond aux nouveaux diagnostics par 100 années-personnes)

Hypertension : % des 19 ans et plus avec un diagnostic d'hypertension

Insuffisance cardiaque congestive (ICC) : % des 40 ans et plus avec diagnostic d'ICC

Arthrite : % des 19 ans et plus avec un diagnostic d'arthrite (rhumatoïde ou arthrose)

Ostéoporose : % des 50 ans et plus avec un diagnostic d'ostéoporose qui réduit la densité des os

Morbidité respiratoire totale : % avec diagnostic de maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique ou aiguë, emphysème ou obstruction chronique des voies respiratoires)

Asthme chez les enfants : % des 5 à 19 ans avec un diagnostic d'asthme

Troubles anxieux et de l'humeur : % d'adultes avec un diagnostic de troubles anxieux et de l'humeur

Troubles liés à la consommation de substances : % d'adultes avec un diagnostic de trouble lié à la consommation de substances (alcool et toxicomanie)

Majorité des soins : % ayant reçu au moins 50 % de leurs soins ambulatoires du même médecin ou infirmier praticien – la continuité étant liée à la satisfaction accrue et de meilleurs résultats en matière de santé

Prescription excessive de benzodiazépines aux personnes âgées dans la communauté : % des 75 ans et plus vivant dans les collectivités (à l'exclusion des foyers de soins personnels) qui avaient au moins deux prescriptions de benzodiazépines ou au moins une avec plus de 30 jours de médicaments.

