


DISTRICT de HANOVER

Sommaire de la MR de Hanover

15 244 HABITANTS




24,3 %
croissance 2013-2018



ESPÉRANCE DE VIE chez les FEMMES plus haute vs le MB



SH-SS 60 802 \$
MB 59 093 \$



à faible revenu
semblable à SH-SS & le MB



ABORDABILITÉ DU LOGEMENT
36 % des locataires et 15 % des propriétaires dépensent 30 % et + sur les frais de logement




INDICE DES FACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES


Reflète les conditions socio-économiques et les déterminants sociaux de la santé (revenu, statut, situation de famille, scolarité, chômage)

MEILLEUR VS le MB
& S'AMÉLIORE

CHÔMAGE




sans-emploi en %
de la population active




SCOLARITÉ

15 ans et plus sans diplôme d'études secondaires, % semblable aux autres niveaux de scolarité



ARTHRITE

plus bas vs le MB




DIABÈTE

prévalence plus basse vs le MB (incidence plus basse vs le MB)




CRISES CARDIQUES

en baisse au fil du temps



HYPERTENSION


% plus bas vs le MB




CÉSARIENNES

% plus bas vs le MB

MALADIES RESPIRATOIRES




MORBIDITÉ RESPIRATOIRE TOTALE
% plus bas vs le MB MAIS en hausse



l'ASTHME chez les ENFANTS
% plus bas vs le MB

SANTÉ MENTALE



TROUBLES ANXIEUX & DE L'HUMEUR plus bas vs le MB



TROUBLES LIÉS À LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES plus bas vs le MB


DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS



EXTRACTIONS DENTAIRES PÉDIATRIQUES taux plus bas vs le MB




GROSSESSES chez les ADOS plus bas vs le MB



SOINS PRÉNATAUX INSUFFISANTS % plus bas vs le MB

SOINS PRIMAIRES



MAJORITÉ DES SOINS % plus bas vs le MB et en baisse



PRESCRIPTION EXCESSIVE DE BENZODIAZÉPINES aux PERSONNES AGÉES (communauté) en baisse



DÉFINITIONS

4

Revenu médian des ménages : Revenu médian combiné total de tous les membres du ménage de plus de 15 ans après impôt.

Faible revenu : Par faible revenu on entend 50 % du revenu médian au Canada ajusté pour la taille et la composition de la famille, en % de ménages et % d'enfants (17 ans et moins).

Abordabilité du logement : Le logement n'est pas abordable s'il faut dépenser 30 % ou plus du revenu du ménage sur les coûts de logement (p.ex. électricité, eau, services municipaux, loyer, hypothèque, etc.)

Indice des facteurs socio-économiques : Reflet du statut socio-économique et les déterminants sociaux de la santé en résultat combiné du revenu moyen des ménages, % de ménages de familles monoparentales, taux de chômage chez les 15 ans et plus et % des 15 ans et plus sans diplôme d'études secondaires

Chômage : % des 15 ans et plus sans emploi en % de la population active

Scolarité : % des 15 ans et plus sans certificat, diplôme, ni degré

Arthrite : % des 19 ans et plus avec un diagnostic d'arthrite (rhumatoïde ou arthrose)

Prévalence du diabète : % total des habitants avec diagnostic de diabète (types 1 et 2, l'incidence correspond aux nouveaux diagnostics par 100 années-personnes)

Crises cardiaques : Taux de décès ou d'hospitalisation causés par les crises cardiaques par 1 000 habitants de 40 ans et plus

Hypertension : % des 19 ans et plus avec un diagnostic d'hypertension

Césariennes: % de césariennes pour naissances à l'hôpital

Morbidité respiratoire totale : % avec diagnostic de maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique ou aiguë, emphysème ou obstruction chronique des voies respiratoires)

Asthme chez les enfants : % des 5 à 19 ans avec un diagnostic d'asthme

Troubles anxieux et de l'humeur : % d'adultes avec un diagnostic de troubles anxieux et de l'humeur

Troubles liés à la consommation de substances : % des 18 ans et plus avec un diagnostic de trouble lié à la consommation de substances (alcool et toxicomanie)

Extractions dentaires pédiatriques : Taux de chirurgies dentaires à l'hôpital avec extractions chez les enfants de moins de 6 ans, par 1 000

Grossesses chez les adolescentes : Taux de grossesses (naissances vivantes, mortinaissances, avortements et grossesses ectopiques) par 1 000 habitantes de 15 à 19 ans

Soins prénatals insuffisants : % de femmes accouchant d'une seule naissance vivante à l'hôpital ne recevant pas ou insuffisamment de soins prénatals (p.ex. visites prénatales régulières)

Majorité des soins : % ayant reçu au moins 50 % de leurs soins ambulatoires du même médecin ou infirmier praticien – la continuité étant liée à la satisfaction accrue et de meilleurs résultats en matière de santé

Prescription excessive de benzodiazépines aux personnes âgées dans la communauté : % des 75 ans et plus vivant dans les collectivités (à l'exclusion des foyers de soins personnels) qui avaient au moins deux prescriptions de benzodiazépines ou au moins une avec plus de 30 jours de médicaments