



DISTRICT de MORDEN

Sommaire de la ville de Morden

10 497 HABITANTS



13,2 %
croissance 2013-2018



ABORDABILITÉ DU LOGEMENT

Parmi les % les plus hauts de locataires (39 %) dans la région qui dépensent 30 % et + sur les frais de logement, et 9 % des propriétaires



SCOLARITÉ

15 ans et plus sans certificat, degré ni diplôme, mais plus (44,5 %) ont fait des études postsecondaires




INDICE DES FACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Reflète les conditions socio-économiques et les déterminants sociaux de la santé (revenu, statut, situation de famille, scolarité, chômage)

MEILLEUR VS le MB & S'AMÉLIORE

CHÔMAGE



sans-emploi en % de la population active

MORTALITÉ



ESPÉRANCE DE VIE
plus haute vs le MB chez
les hommes et les femmes




DÉCÈS PRÉMATURÉS
taux plus bas vs le MB




BENZODIAZÉPINES

prescription excessive aux personnes
âgées (communauté) en baisse


MALADIES CARDIOVASCULAIRES



HYPERTENSION
en baisse au fil du temps



CRISES CARDIAQUES
en baisse au fil du temps




DIABÈTE
prévalence plus basse vs le MB
(incidence aussi plus basse)



OSTÉOPOROSE

en baisse au fil du temps

MALADIES RESPIRATOIRES




MORBIDITÉ RESPIRATOIRE TOTALE
% plus bas vs le MB MAIS en hausse



L'ASTHME chez les ENFANTS
en hausse au fil du temps

SANTÉ MENTALE




TROUBLES ANXIEUX & DE L'HUMEUR
% plus bas vs le MB



TROUBLES LIÉS À LA CONSOMMATION
DE SUBSTANCES % plus bas vs le MB

DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS



NAISSANCES PRÉMATURÉES
% plus bas vs le MB



SOINS PRÉNATALS
INSUFFISANTS en hausse



EXTRACTIONS DENTAIRES
PÉDIATRIQUES taux plus bas
vs le MB & en baisse



Revenu médian des ménages : Revenu médian combiné total de tous les membres du ménage de plus de 15 ans après impôt

Faible revenu : Par faible revenu on entend 50 % du revenu médian au Canada ajusté pour la taille et la composition de la famille, en % de ménages et % d'enfants (17 ans et moins)

Abordabilité du logement : Le logement n'est pas abordable s'il faut dépenser 30 % ou plus du revenu du ménage sur les coûts de logement (p.ex. électricité, eau, services municipaux, loyer, hypothèque, etc.)

Scolarité : % des 15 ans et plus sans certificat, diplôme, ni degré

Indice des facteurs socio-économiques : Reflet du statut socio-économique et les déterminants sociaux de la santé en résultat combiné du revenu moyen des ménages, % de ménages de familles monoparentales, taux de chômage chez les 15 ans et plus et % des 15 ans et plus sans diplôme d'études secondaires

Chômage : % des 15 ans et plus sans emploi en % de la population active

Espérance de vie : Longévité prévue en années selon les causes de décès

Décès prématurés : Nombre de décès avant 75 ans par 1 000 habitants

Prescription excessive de benzodiazépines aux personnes âgées dans la communauté : % des 75 ans et plus vivant dans les collectivités (à l'exclusion des foyers de soins personnels) qui avaient au moins deux prescriptions de benzodiazépines ou au moins une avec plus de 30 jours de médicaments

Hypertension : % des 19 ans et plus avec un diagnostic d'hypertension

Crises cardiaques : Taux de décès ou d'hospitalisation causés par les crises cardiaques par 1 000 habitants de 40 ans et plus

Prévalence du diabète : % total des habitants avec diagnostic de diabète (types 1 et 2, l'incidence correspond aux nouveaux diagnostics par 100 années-personnes)

Ostéoporose : % des 50 ans et plus avec un diagnostic d'ostéoporose qui réduit la densité des os

Morbidité respiratoire totale : % avec diagnostic de maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique ou aiguë, emphysème ou obstruction chronique des voies respiratoires)

Asthme chez les enfants : % des 5 à 19 ans avec un diagnostic d'asthme

Troubles anxieux et de l'humeur : % d'adultes avec un diagnostic de troubles anxieux et de l'humeur

Troubles liés à la consommation de substances : % des 18 ans et plus avec un diagnostic de trouble lié à la consommation de substances (alcool et toxicomanie)

Naissances prématurées : % de naissances vivantes où l'âge gestationnel est inférieur à 37 semaines

Soins prénatals insuffisants : % de femmes accouchant d'une seule naissance vivante à l'hôpital ne recevant pas ou insuffisamment de soins prénatals (p.ex. visites prénatales régulières)

Extractions dentaires pédiatriques : Taux de chirurgies dentaires à l'hôpital avec extractions chez les enfants de moins de 6 ans, par 1 000