


DISTRICT de NIVERVILLE/RITCHOT

Sommaire de la MR de Ritchot et du village de Niverville

13 797 HABITANTS



24,4 %
changements de
2013-2018




à faible revenu
un peu plus bas vs la région & le MB



ABORDABILITÉ DU LOGEMENT

34 % des locataires & 12 % des propriétaires qui dépensent 30 % et plus sur les frais de logement



SCOLARITÉ

15 ans et plus sans certificat, degré ni diplôme, mais la majorité (51,8 %) a fait des études postsecondaires




INDICE DES FACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Reflète les conditions socio-économiques et les déterminants sociaux de la santé (revenu, statut, situation de famille, scolarité, chômage)

MEILLEUR VS le MB & S'AMÉLIORE

TAUX DE CHÔMAGE



sans-emploi en % du marché du travail dans la région, Niverville/Ritchot à la participation au marché du travail la plus haute dans la région (75,4 %)

MORTALITÉ




plus haute vs le MB
en hausse chez les hommes




DÉCÈS PRÉMATURÉS
plus bas vs le MB



**INSUFFISANCE
CARDIAQUE
CONGESTIVE**
en baisse au fil du temps




HYPERTENSION
% plus bas vs le MB




DIABÈTE
la prévalence plus basse
vs le MB MAIS en hausse
(l'incidence aussi plus basse)


DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS



NAISSANCE PRÉMATURÉES
% plus bas vs le MB




SOINS PRÉNATAUX INSUFFISANTS
plus bas vs le MB




GROSSESSES CHEZ LES
ADOS (& naissances)
plus basses vs le MB


SANTÉ MENTALE



TRoubles D'ANXIÉTÉ & DE
L'HUMEUR % plus bas vs le MB




TRoubles LIÉS À LA CONSOMMATION
DE SUBSTANCES % plus bas vs le MB




MORBIDITÉ RESPIRATOIRE

% plus bas ve le MB



HOSPITALISATION

pour blessures non intentionnelles
taux plus bas vs le MB




SOINS à DOMICILE

prévalence plus basse vs le MB



MAJORITÉ des SOINS

en baisse au fil du temps



DÉFINITIONS

4

Revenu médian des ménages : Revenu médian combiné total de tous les membres du ménage de plus de 15 ans après impôt.

Faible revenu : Par faible revenu on entend 50 % du revenu médian au Canada ajusté pour la taille et la composition de la famille, en % de ménages et % d'enfants (17 ans et moins).

Abordabilité du logement : Le logement n'est pas abordable s'il faut dépenser 30 % ou plus du revenu du ménage sur les coûts de logement (p.ex. électricité, eau, services municipaux, loyer, hypothèque, etc.)

Scolarité : % des 15 ans et plus sans certificat, diplôme, ni degré

Indice des facteurs socio-économiques : Reflet du statut socio-économique et les déterminants sociaux de la santé en résultat combiné du revenu moyen des ménages, % de ménages de familles monoparentales, taux de chômage chez les 15 ans et plus et % des 15 ans et plus sans diplôme d'études secondaires

Chômage : % des 15 ans et plus sans emploi en % de la population active

Espérance de vie : Longévité prévue en années selon les causes de décès

Décès prématurés : Nombre de décès avant 75 ans par 1 000 habitants

Insuffisance cardiaque congestive (ICC) : % des 40 ans et plus avec diagnostic d'ICC

Hypertension : % des 19 ans et plus avec un diagnostic d'hypertension

Prévalence du diabète : % total des habitants avec diagnostic de diabète (types 1 et 2, l'incidence correspond aux nouveaux diagnostics par 100 années-personnes)

Naissances prématurées : % de naissances vivantes où l'âge gestationnel est inférieur à 37 semaines

Soins prénatals insuffisants : % de femmes accouchant d'une seule naissance vivante à l'hôpital ne recevant pas ou insuffisamment de soins prénatals (p.ex. visites prénatales régulières)

Grossesses chez les adolescentes : Taux de grossesses (naissances vivantes, mortinaissances, avortements et grossesses ectopiques) par 1 000 habitantes de 15 à 19 ans

Troubles anxieux et de l'humeur : % d'adultes avec un diagnostic de troubles anxieux et de l'humeur

Troubles liés à la consommation de substances : % des 18 ans et plus avec un diagnostic de trouble lié à la consommation de substances (alcool et toxicomanie)

Morbidité respiratoire totale : % avec diagnostic de maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique ou aiguë, emphysème ou obstruction chronique des voies respiratoires)

Hospitalisation pour blessures non intentionnelles : Taux par 1 000 habitants de ceux ayant été hospitalisés pendant au moins un jour avec un diagnostic primaire de blessure non intentionnelle (p. ex. chutes, accident de véhicule)

Prévalence des soins à domicile : Taux par année-personne pour les clients actifs recevant un ou plus services de soins à domicile – ce n'est pas clair si plus bas/plus haut que le MB est mieux/pire – c'est peut-être un reflet de la santé de la population ou plutôt la disponibilité et l'accès aux services

Majorité des soins: % ayant reçu au moins 50 % de leurs soins ambulatoires du même médecin ou infirmier praticien – la continuité étant liée à la satisfaction accrue et de meilleurs résultats en matière de santé