

DISTRICT de ST-PIERRE/DE SALABERRY

Sommaire de la MR de De Salaberry

4 396 HABITANTS



3 %

croissance 2013-2018



63 942 \$

revenu médian des ménages après impôt

SH-SS 60 802 \$
MB 59 093 \$

13 %
ménages



16,5 %
enfants 0-17



à faible revenu

SH-SS : 15 % et 21,1 %
le MB : 15 % et 21,9 %



ABORDABILITÉ DU LOGEMENT

31 % des locataires & 9 % des propriétaires dépensent 30 % et + sur les frais de logement, semblable à la région et la province



SCOLARITÉ


15 ans et plus sans diplôme d'études secondaires mais plus (44,5 %) ont fait des études postsecondaires



INDICE DES FACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Reflète les conditions socio-économiques et les déterminants sociaux de la santé (revenu, statut, situation de famille, scolarité, chômage)

CHÔMAGE




sans-emploi en % de la population active

MEILLEUR VS le MB & S'AMÉLIORE


MORTALITÉ



chez les hommes & femmes plus haute vs le MB et en hausse au fil du temps




DÉCÈS PRÉMATURÉS taux plus bas vs le MB



GROSSESSES chez les ADOS taux plus bas vs le MB

MALADIES CARDIOVASCULAIRES




L'HYPERTENSION % en hausse au fil du temps



ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL en baisse au fil du temps

MALADIES MUSCULO-SQUELETTIQUES




ARTHRITE % en hausse au fil du temps




OSTÉOPOROSE % en baisse au fil du temps


SANTÉ MENTALE



TROUBLES ANXIEUX & DE L'HUMEUR plus bas vs le MB




TROUBLES LIÉS À LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES plus bas vs le MB




la **DÉMENCE** plus bas vs le MB

St-Pierre/De Salaberry



DIABÈTE


prévalence plus basse vs le MB
MAIS en hausse au fil du temps
(incidence aussi plus basse vs le MB)



MORBIDITÉ RESPIRATOIRE

% plus bas vs le MB MAIS en hausse


SOINS PRIMAIRES



MAJORITÉ DES SOINS en baisse au fil du temps



PRESCRIPTION EXCESSIVE DE BENZODIAZÉPINES aux PERSONNES ÂGÉES (communauté) plus haut vs le MB & le plus haut dans la région



DÉFINITIONS

4

Revenu médian des ménages : Revenu médian combiné total de tous les membres du ménage de plus de 15 ans après impôt

Faible revenu : Par faible revenu on entend 50 % du revenu médian au Canada ajusté pour la taille et la composition de la famille, en % de ménages et % d'enfants (17 ans et moins)

Abordabilité du logement : Le logement n'est pas abordable s'il faut dépenser 30 % ou plus du revenu du ménage sur les coûts de logement (p.ex. électricité, eau, services municipaux, loyer hypothèque, etc.)

Scolarité : % des 15 ans et plus sans certificat, diplôme, ni degré

Indice des facteurs socio-économiques : Reflet du statut socio-économique et les déterminants sociaux de la santé en résultat combiné du revenu moyen des ménages, % de ménages de familles monoparentales, taux de chômage chez les 15 ans et plus et % des 15 ans et plus sans diplôme d'études secondaires

Chômage : % des 15 ans et plus sans emploi en % de la population active

Espérance de vie : Longévité prévue en années selon les causes de décès

Décès prématurés : Nombre de décès avant 75 ans par 1 000 habitants

Grossesses chez les adolescentes : Taux de grossesses (naissances vivantes, mortinaissances, avortements et grossesses ectopiques) par 1 000 habitantes de 15 à 19 ans

Hypertension : % des 19 ans et plus avec un diagnostic d'hypertension

Accident vasculaire cérébral (AVC) : Nombre d'hospitalisations ou de décès causés par les AVC par 1 000 habitants de 40 ans ou plus

Arthrite : % des 19 ans et plus avec un diagnostic d'arthrite (rhumatoïde ou arthrose)

Ostéoporose : % des 50 ans et plus avec un diagnostic d'ostéoporose qui réduit la densité des os

Troubles anxieux et de l'humeur : % d'adultes avec un diagnostic de troubles anxieux et de l'humeur

Démence : % des 55 ans et plus avec un diagnostic de démence

Troubles liés à la consommation de substances : % des 18 ans et plus avec un diagnostic de trouble lié à la consommation de substances (alcool et toxicomanie)

Prévalence du diabète : % total des habitants avec diagnostic de diabète (types 1 et 2, l'incidence correspond aux nouveaux diagnostics par 100 années-personnes)

Morbidité respiratoire totale : % avec diagnostic de maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique ou aiguë, emphyseme ou obstruction chronique des voies respiratoires)

Majorité des soins : % ayant reçu au moins 50 % de leurs soins ambulatoires du même médecin ou infirmier praticien – la continuité étant liée à la satisfaction accrue et de meilleurs résultats en matière de santé

Prescription excessive de benzodiazépines aux personnes âgées dans la communauté : % des 75 ans et plus vivant dans les collectivités (à l'exclusion des foyers de soins personnels) qui avaient au moins deux prescriptions de benzodiazépines ou au moins une avec plus de 30 jours de médicaments.

Pour plus de renseignements au sujet des habitants dans votre région et Southern Health-Santé Sud, visitez www.southernhealth.ca pour la version complète de l'Évaluation de la santé communautaire 2019 (disponible en anglais seulement)