




DISTRICT de STE-ANNE/LA BROQUERIE

Sommaire de la MR et le village de Ste-Anne et la MR de La Broquerie


13 199 HABITANTS



INDICE DES FACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Reflète les conditions socio-économiques et les déterminants sociaux de la santé (revenu, statut, situation de famille, scolarité, chômage)

MEILLEUR VS le MB & S'AMÉLIORE


CHÔMAGE



sans-emploi en % de la population active



ESPÉRANCE DE VIE



TROUBLES ANXIEUX & DE L'HUMEUR


% plus bas vs le MB

DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS




GROSSESSES chez les ADOS
taux plus bas vs le MB

Ste-Anne/La Broquerie



SOINS PRÉNATAUX INSUFFISANTS
% plus bas vs le MB




NAISSANCES PRÉMATURÉES
% plus bas vs le MB



EXTRACTIONS DENTAIRES PÉDIATRIQUES
taux plus bas vs le MB


Ste-Anne/La Broquerie



DIABÈTE

la prévalence plus basse vs le MB
(incidence aussi plus basse vs le MB)


maintenant



HOSPITALISATION

pour blessures non-intentionnelles
en baisse au fil du temps

MALADIES RESPIRATOIRES



MORBIDITÉ RESPIRATOIRE TOTALE
% plus bas vs le MB MAIS en hausse



ASHTME chez les ENFANTS
% plus bas vs le MB

SOINS PRIMAIRES



MAJORITÉ DES SOINS
en baisse au fil du temps



PRESCRIPTION EXCESSIVE DE
BENZODIAZÉPINES aux PERSONNES ÂGÉES
(communauté) en baisse au fil du temps



DÉFINITIONS

Revenu médian des ménages : Revenu médian combiné total de tous les membres du ménage de plus de 15 ans après impôt

Faible revenu : Par faible revenu on entend 50 % du revenu médian au Canada ajusté pour la taille et la composition de la famille, en % de ménages et % d'enfants (17 ans et moins)

Abordabilité du logement : Le logement n'est pas abordable s'il faut dépenser 30 % ou plus du revenu du ménage sur les coûts de logement (p.ex. électricité, eau, services municipaux, loyer, hypothèque, etc.)

Scolarité : % des 15 ans et plus sans certificat, diplôme, ni degré

Indice des facteurs socio-économiques : Reflet du statut socio-économique et les déterminants sociaux de la santé en résultat combiné du revenu moyen des ménages, % de ménages de familles monoparentales, taux de chômage chez les 15 ans et plus et % des 15 ans et plus sans diplôme d'études secondaires

Chômage : % des 15 ans et plus sans emploi en % de la population active

Espérance de vie : Longévité prévue en années selon les causes de décès

Troubles anxieux et de l'humeur : % d'adultes avec un diagnostic de troubles anxieux et de l'humeur

Grossesses chez les adolescentes : Taux de grossesses (naissances vivantes, mortinaissances, avortements et grossesses ectopiques) par 1 000 habitantes de 15 à 19 ans

Soins prénatals insuffisants : % de femmes accouchant d'une seule naissance vivante à l'hôpital ne recevant pas ou insuffisamment de soins prénatals (p.ex. visites prénatales régulières)

Naissances prématurées : % de naissances vivantes où l'âge gestationnel est inférieur à 37 semaines

Extractions dentaires pédiatriques : Taux de chirurgies dentaires à l'hôpital avec extractions chez les enfants de moins de 6 ans, par 1 000

Prévalence du diabète : % total des habitants avec diagnostic de diabète (types 1 et 2, l'incidence correspond aux nouveaux diagnostics par 100 années-personnes)

Hospitalisation pour blessures non intentionnelles : Taux par 1 000 habitants de ceux ayant été hospitalisés pendant au moins un jour avec un diagnostic primaire de blessure non intentionnelle (p. ex. chutes, accident de véhicule)

Morbidité respiratoire totale : % avec diagnostic de maladie respiratoire (asthme, bronchite chronique ou aiguë, emphysème ou obstruction chronique des voies respiratoires)

Asthme chez les enfants : % des 5 à 19 ans avec un diagnostic d'asthme

Majorité des soins : % ayant reçu au moins 50 % de leurs soins ambulatoires du même médecin ou infirmier praticien – la continuité étant liée à la satisfaction accrue et de meilleurs résultats en matière de santé

Prescription excessive de benzodiazépines aux personnes âgées dans la communauté : % des 75 ans et plus vivant dans les collectivités (à l'exclusion des foyers de soins personnels) qui avaient au moins deux prescriptions de benzodiazépines ou au moins une avec plus de 30 jours de médicaments